

Versuchsergebnisse Wachstumsregler Triticale 2008

Auch in Triticale wurden erste Versuche zur Überprüfung von Medax Top durchgeführt, wobei hierfür erstmal lange Sorten wie Modus, Vitalis und Benetto geprüft wurde. Bewährte Strategien aus der Vorlage CCC mit Nachlage Camposan wurde verglichen mit Vorlage CCC und Nachlage Medax Top bzw. Vorlage in EC 31 mit Medax Top und der Nachlage Camposan. Sowohl in dem durch lang anhaltende Trockenheit kritischem Jahr 2007 als auch in dem verträglicherem Jahr 2008 zeigten alle Anwendungen leicht positive Ergebnisse. Lager trat in den Versuchen nicht auf. Möglichkeiten für Medax Top könnten sowohl zur ersten Behandlung als auch als Ersatz für Camposan gegeben sein. Momentan sollte man aber noch nicht die sichere, gut kalkulierbare und preiswerte Strategie aus der frühen Behandlung mit CCC und der Nachlage mit Camposan aufgeben.

Weitere Versuche sind hier erforderlich, um Medax Top auch in Triticale sicherer einschätzen zu können und um eventuelle noch nicht erkennbare Vorteile heraus zu arbeiten.

Wachstumsregulierung in Triticale 2007 und 2008

VG	Behandlungen in			2007 n = 2		2008 n = 2	
	EC 29	EC 31/32	EC 39	dt/ha	Einkürzung in cm	dt/ha	Einkürzung in cm
1	Kontrolle			83,4	128	94,4	133
2	CCC 1,5		Camposan 0,4	0,8	10	3,0	18,3
3	CCC 1,5		Medax T. 0,75 + Turbo	2,0	23,2	2,3	35,0
4	CCC 1,5		Medax T. 0,5 + Turbo	k.D.	k.D.	0,7	27,5
5		CCC 1,0 + Moddus 0,2	Camposan 0,4	3,8	23,5	0,3	22,8
6		Medax T. 0,5 + Turbo	Camposan 0,4	k. D.	k.D	2,8	16,4
7		Medax T. 0,75 + Turbo	Camposan 0,4	1,9	16,8	k.D.	k.D.