

Unkrautbekämpfung in Sommergetreide

Sommergetreide ist konkurrenzstark, das letzte Unkraut muss nicht beseitigt werden. Auf leichteren Standorten dominieren neben Melde, Gänsefuß, Taubnessel und Kamille häufig Stiefmütterchen und Knötericharten. Hier haben sich Kombinationen aus 15 - 20 g/ha Grop- per SX + 1,5 l/ha Duplosan DP bewährt. Gegen den relativ schwer bekämpfbaren Vogelknö- terich ist bei starkem Auftreten die max. Duplosan-Menge von 2,5 l/ha zu nutzen.

Entscheidend für die Wirksamkeit ist die Witterung. „Waschküchenwetter“, d. h. warm und feucht, das sind die besten Bedingungen für den Einsatz von Wuchsstoffen. Optimal sind Anwendungen im 3 bis 4-Blattstadium des Getreides. Eine ausreichende Benetzung der Un- kräuter ist dann noch gegeben, zudem wird die Herbizidwirkung durch die rasch zunehmen- de Konkurrenzkraft der Kultur unterstützt. Ab dem 3-Blattstadium des Getreides macht auch eine eventuell notwendige Zumischung von Blattdüngern mehr Sinn. So ist temporärer Man- ganmangel vorzugsweise in Sommergerste und Hafer auf leichten, humosen Standorten zu finden. Bei regelmäßigem Auftreten in Trockenphasen bietet sich die vorbeugende Zumi- schung von z.B. 3 - 4 l/ha Beiselen Mangan Sulfat + 5 kg/ha Epso Combi Top zur Herbizid- behandlung an. Auf besseren Standorten ist neben zahlreichen anderen Möglichkeiten das Unkrautspektrum über Kombinationen aus Tomigan + Pointer SX/Refine Extra SX bzw. Bi- athlon abzudecken. Günstig und gut ist zudem der Zoro Pack. Tristar ist teurer enthält aber keinen Sulfonylharnstoff, der meist eine intensive Spritzenreinigung nach sich zieht.

Zur Unkrasbekämpfung kann in Sommergerste und -weizen Axial 50 zugemischt werden. In Hafer bietet sich auf Windhalmstandorten Concert SX, auf Fuchsschwanzflächen der Ein- satz von Lexus an. Aus Verträglichkeitsgründen ist von weiteren Zumischpartnern abzuraten. Sofern überhaupt erforderlich kann eine zweite Behandlung zu einem späteren Zeitpunkt er- folgen.

Unkrautbekämpfung im Sommergetreide

Kul- tur	Situation / Hinweise	Lösung	ha	€	in AHL	wann
SG SW HA	Leichte Böden, Knöterich, Kornblume Stiefmütterchen, Melde, Gänsefuß, ...	Duplosan DP + Dirigent SX	1,5 l 20 g	28	nein	3 bis 4-Blattsta- dium des Getreides, warme, wüchsige Phase, Konkurrenzkraft der Kultur nutzen
	Bessere Böden, Klette, Kamille, Vogelmiere, Melde, Gänsefuß, Knöterich Taubnessel, wenig Stiefmütterchen und Ehrenpreis	Tomigan 180 + Pointer SX	0,5 l 30 g	24		
		Zoom + Oratio	150 g 40 g	18		
	Alternativ ohne Sulfonyl	Tristar	1,0 l	28		
SG SW	Zumischung von Axial gegen Flughafer, Windhalm Fuchsschwanz oder Weidelgras (nicht in Hafer!)	Axial 50	1,0 l	27		Ab 2-3 Blatt- stadium der Ungräser
Möglichkeiten der Ungras- und Unkrautgekämpfung in Hafer						
SG SW HA	Windhalmstandorte	Concert SX	100 g	22	nein	Ab 2-3 Blatt- stadium der Ungräser
HA	Fuchsschwanzstandorte	Lexus	20 g	25		Ab 1. Blatt auf feuchten Boden