

Winterweizen - LSV NRW 2026

L3ACS16TRZAW

Versuchsform

2-faktorielle Spaltanlage (Sorte + Intensität) mit je 2 Wiederholungen

Versuchsstandorte

Anbaubereich	Köln-Aachener Bucht		Lehmböden			Sandböden	Mittel- und Höhenlagen	
Versuch	Gut Ving (Nörvenich)	Erkelenz-Venrath	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Haus Düsse (Ostinghausen)	Lemgo-Lieme	Greven	Warstein- Allagen	Blomberg- Holstenhöfen
Kreis	DN	HS	KLE	SO	LIP	ST	SO	LIP
Boden	uL/60	uL/90	IU/66	uL/70	uL/72	S/34	L/42	uL/66
Vorfrucht	Zuckerrübe	Kartoffel	Zuckerrübe	Silomais	Silomais	Körnermais	Hafer	Raps
Saatdichte	280 kfK/m²	280 kfK/m²	320 kfK/m²	320 kfK/m²	320 kfK/m²	300 kfK/m²	320 kfK/m²	350 kfK/m²
Saattermin	21.10.2025	20.10.2025	31.10.2025	22.10.2025	08.10.2025	16.10.2025	18.10.2025	18.10.2025
Erntetermin	14.07.2026	24.07.2026	16.07.2026	21.07.2026	24.07.2026	23.07.2026	25.07.2026	08.08.2026

Standardmaßnahmen

Beizung mit Landor CT

N-Düngung bis maximal Düngbedarf (DBE für A/B-Sorten)

Schwefeldüngung mit 20 kg/ha S im Frühjahr

Herbizideinsatz im Herbst oder Frühjahr

Insektizideinsatz bei Bedarf

Behandlungsintensitäten

EC- Stadium	Düngung (N)	Pflanzenschutz		
		reduziert (B1)	angepasst (B2)	intensiv (B3)
0				
13				
21				
(25)-29	X		0,8-1,2 l/ha Regulator 720	0,8-1,2 l/ha Regulator 720
31-32	(X)	0,3-0,5 l/ha Regulator 720	0,3-0,5 l/ha Regulator 720 + 0,1-0,2 l/ha Moddus (+ Fungizide)	0,3-0,5 l/ha Regulator 720 + 0,1-0,2 l/ha Moddus + 1,0 l/ha Balaya + 0,8 l/ha Vegas Plus + 0,8 l/ha Orius
33-34				
37-39				
41-49	X		1,5 l/ha Univoq + 0,6 l/ha Azbany	1,5 l/ha Univoq + 0,6 l/ha Azbany
51				
55				
61-65			(Fungizide)	1,0 l/ha Prosaro

() = Maßnahme nur bei Bedarf

Winterweizen - Kornertag der Sorten in den LSV NRW 2026 bei angepasstem/intensivem Pflanzenschutz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten (Mittelwerte aus angepasstem und intensivem Pflanzenschutz)

Anbaugebiet	Köln-Aachener Bucht			Lehmböden				Sandböden		Mittel- und Höhenlagen			Alle	
Versuch	Gut Ving (Nörvenich)	Erkelenz- Venrath	Mittelwert	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Haus Düsse (Ostingh.)	Lemgo- Lieme	Mittelwert	Greven	Mittelwert	Warstein- Allagen	Blomberg- Holstenhöfen	Mittelwert	Mittelwert	Differenz bei reduziertem Pflanzenschutz* einsatz
Bodenart/Bodenpunkte	uL/60	uL/90		uL/66	uL/70	uL/72		S/34		L/42	uL/66			
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	96,3	99,6		90,7	97,0	97,1		87,2		91,9	98,7		94,8	
vgl. reduziert (dt/ha)	85,7	90,2		86,6	81,0	79,6		80,5		85,7	86,5		84,5	
rel. Grenzdifferenz (5%)	3,9	3,1		3,3	3,1	3,4		4,4		2,7	2,4			
E-Sorten														
Exsal (bg)	94	95	95	94	95	94	94	92	92	90	92	91	93	-9%
A-Sorten														
KWS Donovan	97	101	99	103	102	101	102	104	104	102	103	102	102	-30%
SU Jonte	100	98	99	99	97	98	98	96	96	94	97	96	97	-12%
LG Optimist	101	102	101	96	105	100	100	103	103	104	102	103	102	-9%
SU Tarroca	100	109	105	95	101	96	98	93	93	99	99	99	99	-15%
Willcox	97	102	100	98	98	99	98	98	98	100	100	100	99	-16%
Filius	100	101	100	105	103	103	103	101	101	106	103	105	103	-8%
Intensity (bg)	108	106	107	102	96	97	98	96	96	99	96	98	100	-12%
SU Horizon	105	104	104	104	100	105	103	105	105	107	105	106	104	-12%
KWS Lonnie	96	97	96	96	99	92	96	98	98	105	93	99	97	-10%
B-Sorten														
Chevignon	106	101	104	102	102	102	102	103	103	103	98	101	102	-13%
Debian	102	112	107	102	105	100	102	101	101	103	103	103	104	-26%
RGT Kreuzer	105	101	103	104	97	101	100	102	102	101	98	100	101	-14%
SU Tammo	102	100	101	99	98	94	97	102	102	97	101	99	99	-9%
SU Marathon	101	96	99	102	100	99	100	100	100	101	100	100	100	-13%
LG Tomjol	100	110	105	99	105	101	102	100	100	101	101	101	102	-9%
LG Resonanz	101	105	103	102	106	107	105	108	108	104	107	106	105	-5%
C-Sorten														
KWS Keitum	104	104	104	110	107	109	109	108	108	109	106	108	107	-12%
SY Transition (bg)	109	107	108	104	99	100	101	95	95	95	98	96	101	-10%
Anhang														
Emmert (E)	97	95	96										96	-14%
RGT Reform (A)										101	98	100	100	-11%
Polarkap (A)										102	100	101	101	-12%
SU Magnetron (A)	96	101	98										98	-12%
LG Kermit (A)	100	101	101		96	97	96						99	-30%
KWS Friese (A)										99	98	98	98	-9%
Karoque [A]	110	103	107										107	-14%
Pondor [A]	110	110	110	98	101		100						105	-15%
SU Fiete (B)					94	92	93						93	-12%
Spectral (B)				106	100	104	103	102	102	106	101	103	103	-10%
SU Hybingo (B) (Hy)								112	112				112	-1%
Celebrity [B]	109	102	106	101	NA		101	101	101				103	-13%
Kingkong (B)	106	110	108										108	-10%
RGT Konzert (C)				104	103	105	104	100	100	104	105	105	103	-12%
Winner (bg) (C)				103	101	101	102	99	99	100	100	100	101	-10%
Balzac (bg) (C)	103	106	105	100	98	95	98	93	93				99	-8%
Shrek (C)				104	97	95	98	97	97	98	97	98	98	-11%
Champion				105	96	98	100	95	95	99	95	97	98	-31%
SY Revolution					96		96			102		102	99	-8%
Ökoanhang														
Informer (B)					90	88	89			96	97	97	93	-14%
KWS Imperium (A)	96	102	99	104			104	101	101				101	-8%
Roderik (öko)	83	86	85	88	87		87	86	86	84	87	86	86	-11%
Rübezahl (öko)	96	96	96	94	96	95	95	98	98	95	96	96	96	-10%

Hy = Hybride; bg = begrannt; * reduzierter Pflanzenschutz = ohne Fungizide, geringer Wachstumsreglereinsatz

Winterweizen - Kornertag der Sorten in den LSV NRW 2026 bei reduziertem Pflanzenschutz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten bei angepasstem/intensivem Pflanzenschutz

Anbaugebiet	Köln-Aachener Bucht			Lehmböden				Sandböden		Mittel- und Höhenlagen			Alle
Versuch	Gut Ving (Nörvenich)	Erkelenz- Venrath	Mittelwert	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Haus Düsse (Ostingh.)	Lemgo- Lieme	Mittelwert	Greven	Mittelwert	Warstein- Allagen	Blomberg- Holstenhöfen	Mittelwert	Mittelwert
Bodenart/Bodenpunkte	uL/60	uL/90		lU/66	uL/70	uL/72		S/34		L/42	uL/66		
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	96,3	99,6	97,9	90,7	97,0	97,1	94,9	87,2	87,2	91,9	98,7	95,3	94,8
vgl. reduziert (dt/ha)	85,7	90,2	87,9	86,6	81,0	79,6	82,4	80,5	80,5	85,7	86,5	86,1	84,5
rel. Grenzdifferenz (5%)	7,6	6,0		6,0	6,3	7,4		8,4		5,1	4,8		
E-Sorten													
Exsal (bg)	84	90	87	91	83	79	84	86	86	83	81	82	85
A-Sorten													
KWS Donovan	60	67	63	86	59	57	67	90	90	81	70	75	71
SU Jonte	82	87	84	95	81	81	86	86	86	89	82	85	85
LG Optimist	99	90	95	93	92	82	89	93	93	97	93	95	92
SU Tarroca	84	91	87	90	73	80	81	89	89	92	78	85	84
Willcox	76	81	79	94	70	75	79	93	93	91	83	87	83
Filius	97	96	97	100	85	85	90	99	99	98	95	96	94
Intensity (bg)	94	93	93	98	78	83	87	88	88	89	84	87	88
SU Horizon	94	91	93	96	85	89	90	93	93	98	92	95	92
KWS Lonnie	90	92	91	94	80	79	84	92	92	92	82	87	88
B-Sorten													
Chevignon	96	91	94	96	77	82	85	93	93	92	83	88	89
Debian	64	83	73	86	67	71	74	87	87	88	70	79	77
RGT Kreuzer	90	89	90	95	71	77	81	94	94	94	84	89	87
SU Tammo	87	96	92	96	85	80	87	93	93	95	88	92	90
SU Marathon	90	85	88	94	85	77	85	85	85	93	86	89	87
LG Tomjol	96	103	100	94	94	89	92	95	95	93	85	89	93
LG Resonanz	93	105	99	102	103	99	101	103	103	101	98	100	100
C-Sorten													
KWS Keitum	84	95	89	102	85	89	92	103	103	101	93	97	94
SY Transition (bg)	96	100	98	88	92	88	89	87	87	93	86	89	91
Anhang													
Emmert (E)	80	86	83										83
RGT Reform (A)										92	86	89	89
Polarkap (A)										98	79	89	89
SU Magnetron (A)	84	88	86										86
LG Kermit (A)	67	76	71		65	66	66						69
KWS Friese (A)										97	82	90	90
Karoque [A]	89	94	92										92
Pondor [A]	81	93	87	96	85		90						89
SU Fiete (B)					84	81	82						82
Spectral (B)				104	86	85	91	96	96	100	86	93	93
SU Hybingo (B) (Hy)								110	110				110
Celebrity [B]	81	85	83	97	NA		97	96	96				90
Kingkong (B)	95	100	97										97
RGT Konzert (C)				92	88	81	87	97	97	97	91	94	91
Winner (bg) (C)				98	88	81	89	93	93	97	84	91	90
Balzac (bg) (C)	90	99	94	98	92	79	90	92	92				92
Shrek (C)				95	84	75	85	91	91	91	84	88	87
Champion				82	50	53	62	76	76	84	60	72	68
SY Revolution					84		84			98		98	91
Ökoanhang													
Informer (B)					71	76	74			91	81	86	80
KWS Imperium (A)	84	95	89	95			95	98	98				93
Roderik (öko)	73	72	72	79	70		75	82	82	83	76	80	76
Rübezahl (öko)	89	88	88	89	80	71	80	91	91	93	86	90	86

Hy = Hybride; bg = begrannt; * reduzierter Pflanzenschutz = ohne Fungizide, geringer Wachstumsreglereinsatz

Winterweizen - Korntrag der Sorten in den länderübergreifenden Anbaubereichen bei angepasstem/intensivem Pflanzenschutz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten bei angepasstem/intensivem Pflanzenschutz, inkl. Ergebnissen aus Niedersachsen und Hessen

Anbaubgebiet	Köln-Aachener Bucht							Lehmböden						Sandböden						Mittel- und Höhenlagen						Alle				
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026*		2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026*		2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026*		2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026*		angepasst /intensiv'	reduziert''
Versuche	2	2	2	2	2			6	4	5	6	5			3	2	3	3	3			6	6	6	6	6				
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	111,5	104,6	87,4	110,6	97,9	101,7	n	105,8	98,3	90,3	98,9	88,7	101,4	n	63,3	77,3	65,3	78,9	78,9	74,0	n	102,5	95,6	96,8	106,4	89,4	99,6	n		
E-Sorten																														
Exsal (bg)			101	90	95	95	19			96	93	94	93	32			94	93	94	93	9			97	95	91	94	21	94	-6%
A-Sorten																														
KWS Donovan	102	98	91	99	99	98	32	101	104	95	100	102	100	52	105	101	101	103	104	101	16	101	105	103	103	102	102	30	100	-23%
SU Jonte	99	99	99	94	99	97	31	97	97	99	97	100	97	51	98	97	99	93	98	96	18	97	99	98	96	97	96	32	96	-8%
LG Optimist		104	108	104	101	103	11		101	104	102	103	101	26		99	102	102	101	100	12		97	104	101	104	101	23	101	-8%
SU Tarroca			103	101	105	103	6			99	99	98	99	16			90	101	95	95	9			101	100	103	101	16	100	-12%
Willcox			100	98	100	99	10			103	102	100	101	21			104	103	100	102	9			101	101	99	100	16	101	-12%
Filius				98	100	99	8				100	100	101	16				100	100	99	6				102	106	103	11	101	-8%
Intensity (bg)				108	107	102	10				103	101	101	15				101	98	99	6				102	99	98	7	100	-8%
SU Horizon					104	104	6					106	105	9					103	104	3					104	103	4	105	-7%
KWS Lonnie					96	98	6					97	100	9					98	98	3					96	96	6	99	-7%
B-Sorten																														
Chevignon	102	105	90	100	104	100	12	103	102	97	102	104	101	31	109	99	96	105	98	100	18	97	98	95	103	99	97	22	99	-10%
Debian	109	111	114	109	107	108	12	105	104	104	106	102	103	24	105	108	102	106	101	103	11	104	101	104	108	103	103	16	104	-19%
RGT Kreuzer		103	102		103	102	19		104	103	102	100	102	33		108	104	103	101	103	11		105	102	101	100	102	22	102	-10%
SU Tammo			99	106	101	102	9			102	102	102	100	22			100	102	97	100	9			98	103	103	100	19	100	-8%
SU Marathon				102	99	101	7				103	101	100	16				104	100	101	6				103	98	100	13	101	-8%
LG Tomjol				104	105	104	8			104	101	102	16				104	101	102	6				106	102	103	7	103	-7%	
LG Resonanz					103	104	6					103	105	9					106	107	3					106	104	6	105	-3%
C-Sorten																														
KWS Keitum	108	111	110	103	104	105	12	108	107	109	108	108	106	31	118	104	111	107	109	106	18	108	100	104	105	106	104	22	105	-11%
SY Transition (bg)					108	103	4					103	101	6					94	95	3					97	97	4	100	-9%
Anhang																														
Emmert (E)				95	96	98	8																		96	98	95	9	96	-10%
RGT Reform (A)	100	100	96	101		97	32	100	102	97	101		97	48	96	99	98	100		96	13	98	100	93	98	100	96	24	97	-11%
Polarkap (A)	96	96				95	6	97	100	100	93		96	19	96	96	94		96	8	96	102	102	100	102	99	26	97	-10%	
SU Magnetron (A)			99	98	98	99	10			97	98		96	15			95	97		95	6			92	99	92	94	10	96	-9%
LG Kermit (A)			103	103	101	102	10			101	102	100	100	20			103	99	102	101	7			99	100	103	100	16	100	-17%
KWS Friese (A)				104		100	6				103		101	10				101		99	2				105	97	99	13	99	-9%
Karouque (A)					107	102	4																						101	-10%
Pondor [A]			97	103	110	102	8					102	101	5					102	103	2					98	98	2	100	-11%
SU Fiete (B)	99	102	103	95		98	9	99	96	101	97	93	96	24	100	99	102	99		98	12	101	99	103	96	97	98	26	97	-8%
Spectral (B)		101	99	101		101	7		106	102	105	103	102	23		110	104	101	103	102	9		107	104	103	100	102	22	102	-9%
SU Hybingo (Hy) (B)																		110	112	3									105	-2%
Celebrity [B]			94	107	106	102	7			91	105	101	102	6			101	108	101	103	3								102	-11%
Kingkong (B)					108	106	6																						103	-5%
RGT Konzert (C)			103			104	6			102	101	104	101	18			96	100	100	98	7			100	102	106	102	16	102	-8%
Winner (bg) [C]		106	97	107		103	6		102	102	104	104	101	23		111	102	102	105	104	12		107	96	104	100	101	12	102	-10%
Balzac (bg) [C]				104	105	100	5				97	99	99	13				101	98	98	6				99		98	4	98	-6%
Shrek [C]				102		103	3				102	98	101	10				104	97	100	4				103	98	100	6	101	-8%
Champion			100			97	2			101	106	100	102	9			100	108	95	101	3			100	109	97	102	6	101	-24%
SY Revolution												96	98	1											102	101	1	99	-5%	
Ökoanhang																														
Informer (B)	101	92	94			94	30	103	100	96	100	89	97	49	94	101	98			96	12	101	104	100	101	97	99	28	97	-12%
KWS Imperium (A)	99	105	105	98	99	99	13	103	103	108	106	104	101	20	105	99	102	108	101	100	14	100	97	98	98	105	98	18	100	-10%
Roderik (A) (öko)					85	85	2					87	89	2					86	82	1					86	86	2	86	-9%
Rübezahl (A) (öko)					96	94	2					95	96	3				98	98	1						96	96	2	96	-7%

Hy = Hybride; bg = begrannt; kursiv = nicht in allen Versuchen geprüft; " Ertrag bei angepasstem/intensivem Pflanzenschutz, " Differenz bei reduziertem Pflanzenschutz (ohne Fungizide, geringer Wachstumsreglereinsatz)

* Hohenheim-Gütlower Serienauswertung (inkl. WP-, BSV- und EUSV-Ergebnissen, n = Anzahl der Versuche)

Winterweizen - Proteingehalt der Sorten in den LSV NRW 2026 bei angepasstem/intensivem Pflanzenschutz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbaubereich	Köln-Aachener Bucht			Lehmböden				Sandböden		Mittel- und Höhenlagen			Alle
Versuch	Gut Ving (Nörvenich)	Erkelenz- Venrath	Mittelwert	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Haus Düse (Ostingh.)	Lemgo- Lieme	Mittelwert	Greven	Mittelwert	Warstein- Allagen	Blomberg- Holstenhöfen	Mittelwert	Mittelwert
Bodenart/Bodenpunkte	uL/60	uL/90		lU/66	uL/70	uL/72		S/34		L/42	uL/66		
rel. 100 = Protein (% TM)	11,9	14,3	13,1	10,3	13,4	12,7	12,2	12,0	12,0	11,3	12,7	12,0	12,3
E-Sorten													
Exsal (bg)	106	108	107	107	106	107	106	107	107	109	109	109	107
A-Sorten													
KWS Donovan	100	100	100	103	101	100	101	103	103	101	99	100	101
SU Jonte	103	105	104	102	103	100	102	101	101	101	102	102	102
LG Optimist	97	98	97	102	97	99	99	100	100	97	97	97	98
SU Tarroca	103	103	103	107	105	101	104	102	102	101	101	101	103
Willcox	99	98	99	101	101	103	102	102	102	100	101	101	101
Filius	101	99	100	102	100	100	101	103	103	99	99	99	100
Intensity (bg)	96	96	96	106	100	102	103	103	103	105	103	104	101
SU Horizon	97	93	95	96	95	97	96	96	96	94	94	94	95
KWS Lonnie	106	104	105	107	108	107	107	105	105	102	102	102	105
B-Sorten													
Chevignon	96	95	95	97	97	99	98	98	98	96	96	96	97
Debian	99	95	97	102	96	97	98	97	97	99	96	98	98
RGT Kreuzer	96	93	94	95	97	97	96	96	96	101	99	100	97
SU Tammo	96	101	98	103	102	104	103	103	103	104	104	104	102
SU Marathon	98	98	98	96	97	100	98	97	97	97	99	98	98
LG Tomjol	97	99	98	105	99	98	101	99	99	100	98	99	99
LG Resonanz	99	101	100	96	100	93	96	95	95	96	94	95	97
C-Sorten													
KWS Keitum	92	95	93	93	92	94	93	92	92	92	92	92	93
SY Transition (bg)	97	96	96	101	101	102	101	102	102	101	98	100	100
Anhang													
Emmert (E)	110	110	110										110
RGT Reform (A)										98	100	99	99
Polarkap (A)										102	102	102	102
SU Magnetron (A)	103	108	106										106
LG Kermit (A)	106	105	105		101	103	102						104
KWS Friese (A)										95	96	95	95
Karoque [A]	100	97	99										99
Pondor [A]	96	95	95	99	99		99						97
SU Fiete (B)					103	104	104						104
Spectral (B)				90	96	97	94	92	92	94	96	95	94
SU Hybingo (B) (Hy)								94	94				94
Celebrity [B]	93	93	93	102	94		98	98	98				96
Kingkong (B)	92	93	92										92
RGT Konzert (C)				98	101	99	99	99	99	99	101	100	99
Winner (bg) (C)				97	93	100	97	97	97	99	96	97	97
Balzac (bg) (C)	99	94	96	100	98	99	99	101	101				99
Shrek (C)				100	99	98	99	100	100	99	99	99	99
Champion				91	98	96	95	94	94	97	95	96	95
SY Revolution					96		96			97		97	97
Ökoanhang													
Informer (B)					104	99	102			96	99	98	100
KWS Imperium (A)	104	102	103	101			101	97	97				101
Roderik (öko)	115	111	113	118	114		116	114	114	113	111	112	114
Rübezahl (öko)	105	105	105	111	106	104	107	107	107	106	105	105	106

Hy = Hybride; bg = begrannt

Winterweizen - Hektolitergewicht (HLG) der Sorten in den LSV NRW 2025 bei angepasstem/intensivem Pflanzenschutz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbaubereich	Köln-Aachener Bucht			Lehmböden				Sandböden		Mittel- und Höhenlagen			Alle
Versuch	Gut Ving (Nörvenich)	Erkelenz- Venrath	Mittelwert	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Haus Düsse (Ostingh.)	Lemgo- Lieme	Mittelwert	Greven	Mittelwert	Warstein- Allagen	Blomberg- Holstenhöfen	Mittelwert	Mittelwert
Bodenart/Bodenpunkte	uL/60	uL/90		lU/66	uL/70	uL/72		S/34		L/42	uL/66		
rel. 100 = HLG (kg)	79,0	78,8	78,9	80,8	78,8	78,1	79,3	79,7	79,7	78,0	77,2	77,6	78,8
E-Sorten													
Exsal (bg)	103	103	103	103	103	102	103	103	103	104	103	103	103
A-Sorten													
KWS Donovan	102	103	103	101	102	101	101	103	103	100	101	100	102
SU Jonte	101	99	100	101	99	99	100	98	98	96	99	97	99
LG Optimist	100	101	101	98	100	100	99	100	100	100	100	100	100
SU Tarroca	99	103	101	100	100	99	100	100	100	98	98	98	100
Willcox	97	99	98	98	99	99	99	98	98	99	98	99	99
Filius	101	100	100	100	100	101	100	101	101	101	101	101	101
Intensity (bg)	102	100	101	102	99	99	100	102	102	102	99	100	101
SU Horizon	102	101	101	101	101	100	101	102	102	101	100	101	101
KWS Lonnie	104	103	104	103	103	103	103	104	104	101	102	102	103
B-Sorten													
Chevignon	102	101	101	99	101	99	99	101	101	101	98	99	100
Debian	99	101	100	99	99	97	98	99	99	99	96	98	99
RGT Kreuzer	99	99	99	100	98	99	99	98	98	99	98	98	99
SU Tammo	100	100	100	99	98	98	98	100	100	99	100	99	99
SU Marathon	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	100	100	99
LG Tomjol	98	102	100	99	102	101	101	100	100	100	100	100	100
LG Resonanz	100	101	101	101	102	102	102	103	103	102	101	101	101
C-Sorten													
KWS Keitum	98	98	98	98	98	97	97	97	97	98	97	97	97
SY Transition (bg)	104	105	104	102	102	100	102	104	104	101	99	100	102
Anhang													
Emmert (E)	99	100	100										100
RGT Reform (A)										100	99	100	100
Polarkap (A)										105	102	104	104
SU Magnetron (A)	101	99	100										100
LG Kermit (A)	97	94	95		93	93	93						94
KWS Fries (A)										92	96	94	94
Karoque [A]	103	103	103										103
Pondor [A]	102	102	102	101	101		101						101
SU Fiete (B)					99	98	98						98
Spectral (B)				97	98	97	97	97	97	98	98	98	97
SU Hybingo (B) (Hy)								100	100				100
Celebrity [B]	99	99	99	98	99		98	100	100				99
Kingkong (B)	104	104	104										104
RGT Konzert (C)				101	100	100	100	100	100	97	99	98	99
Winner (bg) (C)				99	99	97	98	101	101	99	99	99	99
Balzac (bg) (C)	105	105	105	102	101	101	101	105	105				103
Shrek (C)				101	100	100	100	101	101	100	102	101	101
Champion				92	89	89	90	90	90	96	92	94	91
SY Revolution					99		99			98		98	98
Ökoanhang													
Informer (B)					91	93	92			96	96	96	94
KWS Imperium (A)	102	101	102	100			100	101	101				101
Roderik (öko)	104	105	105	104	105		105	105	105	105	105	105	105
Rübezahl (öko)	100	102	101	100	101	100	100	101	101	99	99	99	100

Hy = Hybride; bg = begrannt

Winterweizen - Fallzahl der Sorten in den LSV NRW 2026 bei angepasstem/intensivem Pflanzenschutz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbaubereich	Köln-Aachener Bucht			Lehmböden				Sandböden		Mittel- und Höhenlagen			Alle
Versuch	Gut Ving (Nörvenich)	Erkelenz- Venrath	Mittelwert	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Haus Düsse (Ostingh.)	Lemgo- Lieme	Mittelwert	Greven	Mittelwert	Warstein- Allagen	Blomberg- Holstenhöfen	Mittelwert	Mittelwert
Bodenart/Bodenpunkte	uL/60	uL/90		IU/66	uL/70	uL/72		S/34		L/42	uL/66		
rel. 100 = Fallzahl (s)	426	415	421	409	371	386	389	409	409				403
E-Sorten													
Exsal (bg)	103	99	101	98	95	96	96	104	104				99
A-Sorten													
KWS Donovan	93	94	93	95	89	84	89	93	93				91
SU Jonte	106	108	107	108	109	96	104	106	106				106
LG Optimist	101	103	102	103	107	108	106	97	97				103
SU Tarroca	90	84	87	55	65	62	61	53	53				68
Willcox	98	97	98	97	104	97	99	92	92				97
Filius	96	99	97	94	102	98	98	98	98				98
Intensity (bg)	95	97	96	90	107	101	99	99	99				98
SU Horizon	99	98	99	100	107	104	104	102	102				102
KWS Lonnie	101	99	100	103	102	100	102	101	101				101
B-Sorten													
Chevignon	101	98	100	104	99	102	102	95	95				100
Debian	103	83	93	69	61	57	62	84	84				76
RGT Kreuzer	107	93	100	106	85	99	97	98	98				98
SU Tammo	93	93	93	95	83	92	90	92	92				91
SU Marathon	96	96	96	97	97	98	97	97	97				97
LG Tomjol	91	95	93	96	100	100	99	101	101				97
LG Resonanz	94	105	99	98	102	107	102	108	108				102
C-Sorten													
KWS Keitum	95	89	92	73	71	66	70	77	77				78
SY Transition (bg)	94	101	98	102	104	99	102	95	95				99
Anhang													
Emmert (E)	104	106	105										105
RGT Reform (A)													
Polarkap (A)													
SU Magnetron (A)	102	98	100										100
LG Kermit (A)	94	98	96		101	100	100						98
KWS Friese (A)													
Karoque [A]	109	114	112										112
Pondor [A]	101	101	101	106	112		109						105
SU Fiete (B)					86	79	82						82
Spectral (B)				101	104	96	100	100	100				100
SU Hybingo (B) (Hy)								91	91				91
Celebrity [B]	92	96	94	91	103		97	93	93				95
Kingkong (B)	102	99	101										101
RGT Konzert (C)				90	95	86	90	94	94				91
Winner (bg) (C)				90	95	94	93	94	94				93
Balzac (bg) (C)	95	98	97	98	101	99	99	97	97				98
Shrek (C)				104	114	107	108	99	99				106
Champion				68	70	82	73	86	86				77
SY Revolution					87		87						87
Ökoanhang													
Informer (B)					104	100	102	105	105				103
KWS Imperium (A)	102	113	107	115			115						110
Roderik (öko)	102	100	101	99	100		100	102	102				101
Rübezahl (öko)	102	89	96	99	73	91	88	88	88				90

Hy = Hybride; bg = begrannt


Winterweizen - Qualitätseigenschaften der Sorten

relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Merkmal	Proteingehalt (% TM)						Hektolitergewicht (kg)						Fallzahl (s) und -stabilität					
Jahr	APS*	2022	2023	2024	2025	2026	APS*	2022	2023	2024	2025	2026	APS*	2022	2023	2024	2025	2026
Versuche		17	14	16	17	15		14	14	14	15	14		13	12	12	17	6
rel. 100 =		10,9	11,7	11,1	11,8	12,2		78,0	73,3	74,2	77,5	77,0		342	166	373	303	403
E-Sorten																		
Exsal (bg)	6			108	107	107	6			103	102	103	8 / +			106	121	99
A-Sorten																		
KWS Donovan	4	103	101	102	103	101	5	102	100	102	101	102	6 / +	92	97	100	115	91
SU Jonte	4	103	101	102	102	103	5	100	100	101	99	99	9 / +	115	101	115	113	106
LG Optimist	3		98	98	98	98	5		100	101	101	100	8 / +		106	112	115	103
SU Tarroca	5			105	104	105	5			100	99	100	5 / -			78	59	68
Willcox	3			98	99	101	5			100	99	98	7 / +			103	107	97
Filius	4				102	101	6				101	101	7 / +				101	98
Intensity (bg)	4				98	101	5				99	101	7 / +				113	98
SU Horizon	1					95	5					101	8 / +					102
KWS Lonnie	4					103	7					102	6 / -					101
B-Sorten																		
Chevignon	3	98	96	97	96	96	5	98	96	99	99	100	8 / o	105	75	105	79	100
Debian	2	96	98	100	95	98	4	99	98	99	99	99	5 / +	93	84	75	93	76
RGT Kreuzer	2		94	94	95	96	5		100	101	100	98	8 / o		71	109	105	98
SU Tammo	4			100	99	101	5				100	99	6 / +			99	95	91
SU Marathon	3				98	98	5				100	100	7 / +				112	97
LG Tomjol	3				96	99	5				101	100	7 / +				102	97
LG Resonanz	2					97	6					101	7 / +					102
C-Sorten																		
KWS Keitum	1	91	92	91	92	93	4	98	94	100	99	98	3 / -	79	58	78	78	78
SY Transition (bg)	4					101	6					102	7 / +					99
Anhang																		
Emmert (E)	7				107	108	5				99	100	9 / +				139	105
RGT Reform (A)	4	100	99	100	99	99	6	101	103	102	102	100	9 / +	109	139	114	129	
Polarkap (A)	5	105	100	104	106	102	6	102	102	103	102	103	6 / o	100	101	102	98	
SU Magnetron (A)	6			110	107	107	5			100	100	99	7 / -			104	87	100
LG Kermit (A)	4			102	100	100	4				96	95	7 / +			97	108	98
KWS Friese (A)	1				93	95	4				97	92	5 / o				92	
Karoque [A]	6					99	6					103	7 / o					112
Pondor [A]	2			95	92	96	5			97	99	100	6 / o			102	69	105
SU Fiete (B)	3	103	102	103	105	104	5	101	100	102	101	98	6 / o	91	81	102	95	82
Spectral (B)	2		94	94	95	95	5		99	100	99	98	7 / +		99	104	108	100
SU Hybingo (B) (Hy)	2					97	5					101	5 / -					91
Celebrity [B]	2			102	95	96	5			97	99	99	6 / o			94	97	95
Kingkong (B)	3					92	6					104	6 / -					101
RGT Konzert (C)	4			104	105	99	5			101	101	99	6 / o			106	88	91
Winner (bg) (C)	2		99	99	98	98	5		99	99	99	100	6 / o		74	86	78	93
Balzac (bg) (C)	3				100	100	5				101	104	7 / o				76	98
Shrek (C)	3				96	99	5				101	100	7 / o				105	106
Champion	1			93	90	95	3			93	95	91	6 / o			89	73	77
SY Revolution	3					97	5					98	7 / o					87
Ökoanhang																		
Informer (B)	3	96	98	97	97	100	4	97	98	96	99	94	7 / +	105	111	103	104	106
KWS Imperium (A)	3	102	100	100	103	101	5	101	101	102	102	101	9 / +	120	119	116	122	107
Roderik (A) (öko)						114						105						101
Rübezahl (A) (öko)						106						100						90

* Ausprägungsstufen nach Beschreibender Sortenliste und weiteren Informationen; kursive Werte = nicht in allen Versuchen geprüft; kursive Ausprägungsstufen = Vertriebsbeschreibung; unterstrichen = verän

Winterweizen - Kornertrag-Proteingehalt-Diagramm
Ergebnisse aus nordwestdeutschen Landessortenversuchen



Winterweizen - Sortenempfehlungen

für die Aussaat im Herbst 2026

Prüfjahre	Sorte	Qualität	Anbaubereich				Sorteneigenschaften											Saatgut- vermehrung DE 2026 (ha)
			Köln- Aachener Bucht	Lehm- böden	Sand- böden	Mittel- u. Höhen- lagen	Frühsaat- eignung	Spätsaat- eignung	Stoppel- weizen	frühreif	winterhart	standfest	früh blatt- gesund	fusarium- resistent	CTU- tolerant	hoher Protein- gehalt	sichere Fallzahl	
E-Sorten																		
3+	Exsal (bg)	E	(Q)	(Q)	(Q)		(-)	(+)	(+)	o	-	++	o	++	X	++	+	2612
A-Sorten																		
3+	KWS Donovan	A	(Q)	(Q)	(Q)	(Q)	(-)	o	o	o	(-)	(+)	---	(-)	X	(+)	o	618
	<u>SU Jonte</u>	<u>A</u>	<u>Q</u>	<u>Q</u>	<u>Q</u>	<u>Q</u>	(+)	(-)	o	(-)	+	(+)	o	(+)	X	(+)	+	1323
	LG Optimist	A	X	X	X	X	o	(+)	(+)	o	++	---	o	(+)	X	(-)	+	2427
	Willcox	A	(X)	X	X	(X)	o	o	o	o	(-)	(+)	++	o	X	o	(+)	92
2	Filius	A	(Q)	(Q)		(Q)	(-)	(+)	o	o	o	(-)	+	(+)	(X)	o	o	29
	Intensity (bg)	A	Q	Q	Q	(Q)	(-)	+	(+)	+	-	+	o	+	O	o	(+)	1070
1	SU Horizon	A	F	F	F	(F)	(-)	(+)	o	(+)	-	(+)	+	o	(X)	-	+	738
B-Sorten																		
3+	<u>Chevignon</u>	<u>(B)</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	X	(-)	(+)	o	+	o	(-)	(-)	(-)	X	(-)	o	2646
	<u>Debian</u>	B	<u>X</u>	X	X	X	-	+	(-)	o	(+)	(-)	---	---	X	(-)	o	265
	<u>RGT Kreuzer</u>	<u>B</u>	<u>F</u>	<u>F</u>	<u>F</u>	<u>F</u>	(+)	(-)	o	o	++	(+)	o	(+)	X	--	o	1132
	SU Tammo	B	(X)	(X)	(X)	(X)	o	(+)	o	(+)	o	o	(+)	o	X	o	o	134
2	SU Marathon	B	X	X	X	X	(+)	o	o	(-)	(+)	+	o	(+)	(X)	o	(+)	96
	LG Tomjol	B	X	X	X	X	(+)	o	o	o	+	(-)	++	(+)	(X)	(-)	(+)	619
1	LG Resonanz	B	F	F	F	F	o	o	o	-	+	-	+++	(+)	(X)	-	(+)	337
C-Sorten																		
7	<u>KWS Keitum</u>	<u>C</u>	<u>F</u>	<u>F</u>	<u>F</u>	<u>F</u>	-	o	(+)	o	-	-	o	(+)	X	---	---	2218
Anhang																		
3+	Polarkap	A				(Q)	(+)	o	o	o	++	o	(-)	(+)	X	+	o	1086
	SU Magnetron	A	(Q)				(-)	o	o	(+)	--	++	(-)	o	X	+++	o	711
	<u>Spectral</u>	B	F	<u>F</u>	<u>F</u>	<u>F</u>	(+)	(-)	o	-	o	(+)	(+)	(+)	(X)	--	(+)	1934
	Celebrity	(B)	(X)	(X)	(X)		-	+	(-)	++	--	(+)	(-)	--	(X)	(-)	o	274
	RGT Konzert	C	(F)	(F)		(F)	o	o	(+)	o	o	o	(+)	(+)	X	+	o	47
	Winner (bg)	(C)	F	F	F	(F)	(-)	+	(+)	++	-	++	o	++	NEIN	(-)	o	101
2	Emmert	E	(Q)				o	o	o	(-)	+	o	o	o	(X)	+++	+++	584

bg = begrenzt; +++ = sehr positive Sorteneigenschaft, o = durchschnittliche Sorteneigenschaft, --- = sehr negative Sorteneigenschaft

Hauptempfehlungen, X = generelle Empfehlung, (X) = bedingte Empfehlung, Q = qualitätsbetonte Sorte, F = futterbetonte Sorte

Winterweizen - Sortenbeschreibungen

Beschreibende Sortenliste 2026 und weitere Informationen

Sorte	Qualität	Vertrieb	Zulassung	Ährenschieben	Kornreife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Gelbrost	Blattseptoria	DTR	Braunrost	Ährenfusarium	Proteingehalt	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Bestandesdicke	Kornzahl/Ähre	Tausendkornmasse	Ertrag extensiv	Ertrag intensiv
Balzac (bg)	(C)	Hauptsaaen	FR 2021	3	4	4	<u>5-6</u>	5	5	4	3	4		3	4	3	5	7	0	6	6	3	8	7
Celebrity	(B)	IG Pflanzenzucht	FR 2022	3	3	4	<u>6-7</u>	4	5	2	4	4		4	6	3	5	6	0	5	6	7	7	8
Champion		DSV	DK 2021	6	6	4	<u>5-6</u>	4	5	4	7	4	5	5	6	1	3	6	0	5	6	5	5	8
Chevignon	(B)	Hauptsaaen	FR 2016	4	4	4	<u>5</u>	5	5	5	2	5	5	4	5	3	5	8	0	5	6	5	7	7
Debian	B	DSV	DE 2022	4	5	5	<u>4-5</u>	5	5	4	6	4	5	5	7	2	4	5	+	4	7	5	6	8
Emmert	E	Secobra	DE 2025	5	5	4	<u>4</u>	4	5	2	3	4	5	4	5	7	5	9	+	5	5	5	6	5
Exsal (bg)	E	DSV	DE 2023	5	5	5	<u>6</u>	3	3	3	3	3	6	3	3	6	6	8	+	5	5	5	6	5
Filius	A	Syngenta	DE 2025	5	5	5	<u>5</u>	5	5	3	2	3	4	2	4	4	6	7	+	5	6	6	7	6
Informer	B	Limagrain	DE 2018	6	6	5	<u>4</u>	4	5	2	1	3	4	4	5	3	4	7	o	4	5	7	6	6
Intensity (bg)	A	Ackermann SZ	DE 2025	3	4	3	<u>6</u>	3	3	4	2	4	4	4	3	4	5	7	+	6	5	5	7	7
Karoke	(A)	DSV	FR 2023	3	4	3	<u>5</u>	4	5	4	2	4	5	4	5	6	6	7	o	4	6	5	6	7
Kingkong	B	Secobra	DE 2026	4	4	4	<u>5</u>	5	5	2	2	4	6	4	5	3	6	5	-	5	7	4	8	7
KWS Donovan	A	KWS Saat	DE 2020	5	5	5	<u>5-6</u>	4	3	4	4	4	5	8	5	4	5	6	+	5	5	5	4	7
KWS Friese	A	KWS Saat	DE 2025	7	6	5		3	5	3	2	4	4	4	5	1	4	5	o	4	6	8	7	8
KWS Imperium	A	KWS Saat	DE 2021	5	5	5	<u>4-5</u>	7	5	2	2	4	5	4	4	3	5	9	+	5	5	6	6	6
KWS Keitum	C	KWS Saat	DE 2020	5	5	5	<u>6</u>	6	5	2	3	4	5	4	4	1	4	3	-	5	5	7	8	8
KWS Lonnie	A	KWS Saat	DE 2026	5	5	5		5	3	3	2	3	4	3	4	4	7	6	-	6	5	4	7	6
LG Kermit	A	Limagrain	DE 2024	5	6	4	<u>6</u>	4	3	3	2	4	5	6	5	4	4	7	+	5	5	5	5	7
LG Optimist	A	Limagrain	DE 2023	4	5	5	<u>3-4</u>	7	3	6	2	4	5	2	4	3	5	8	+	5	4	7	8	7
LG Resonanz	B	Limagrain	DE 2026	5	6	6	<u>4</u>	6	5	3	1	3	4	2	4	2	6	7	+	6	4	7	9	8
LG Tomjol	B	Limagrain	DE 2025	5	5	5	<u>4</u>	5	5	3	1	3	4	3	4	3	5	7	+	6	7	4	8	7
Polarkap	A	DSV	DE 2022	5	5	5	<u>3-4</u>	5	5	2	4	4	5	4	4	5	6	6	o	5	4	7	6	6
Pondor	(A)	Hauptsaaen	FR 2023	4	4	3	<u>5</u>	3	2	5	3	5	4	5	4	2	5	6	0	6	7	4	7	8
RGT Konzert	C	RAGT	DE 2024	5	5	5	<u>5</u>	5	3	3	2	4	5	3	4	4	5	6	o	4	5	7	8	7
RGT Kreuzer	B	RAGT	DE 2023	5	5	4	<u>3-4</u>	4	5	4	2	4	5	4	4	2	5	8	o	5	6	5	7	7
RGT Reform	A	RAGT	DE 2014	6	5	3	<u>4</u>	4	5	3	4	5	6	3	4	4	6	9	+	6	4	5	6	6
Shrek	(C)	Hauptsaaen	FR 2021	4	4	4	<u>5</u>	4	5	4	1	3		3	5	3	5	7	0	7	6	3	8	7
Spectral	B	Limagrain	DE 2023	6	6	4	<u>5</u>	4	5	2	2	4	5	3	4	2	5	7	+	5	6	6	7	8
SU Fiete	B	Saaten-Union	DE 2021	5	6	6	<u>5</u>	4	3	2	1	3	5	4	5	3	5	6	o	4	6	6	7	6
SU Horizon	A	Saaten-Union	DE 2026	4	4	4	<u>6</u>	4	5	3	2	3	4	3	5	1	5	8	+	6	3	6	9	9
SU Hybingo	B	Saaten-Union	DE 2024	4	5	6		6	5	2	2	4	4	2	3	2	5	5	-	6	5	5	9	9
SU Jonte	A	Saaten-Union	DE 2021	6	5	4	<u>4</u>	4	3	4	2	4	5	4	4	4	5	9	o	5	5	5	6	6
SU Magnetron	A	Saaten-Union	DE 2024	4	4	4	<u>6-7</u>	3	3	3	3	4	6	4	5	6	5	7	-	5	7	4	6	6
SU Marathon	B	Saaten-Union	DE 2025	5	5	3	<u>4-5</u>	3	5	3	2	5	4	3	4	3	5	7	+	5	6	6	8	7
SU Tammo	B	Saaten-Union	DE 2023	3	5	5	<u>5</u>	5	3	2	2	4	5	4	5	4	5	6	o	4	7	5	7	7
SU Tarroca	(A)	Hauptsaaen	PL 2020	6	6	4	<u>5</u>	3	3	4	2	5	5	5	5	5	5	5	-	3	5	8	6	7
SY Revolution		Syngenta Seeds	NL 2022	5	5	5	<u>5</u>	3	5	2	2	4	5	5	5	3	5	7	0	5	6	6	7	8
SY Transition (bg)	(C)	Syngenta Seeds	FR 2023	4	4	3	<u>4-5</u>	3	5	3	2	3	5	3	4	4	6	7	+	6	4	7	7	7
Willcox	A	IG Pflanzenzucht	DE 2024	5	5	5	<u>5-6</u>	4	5	2	1	3	5	4	5	3	5	7	+	5	6	4	7	7
Winner (bg)	(C)	Syngenta Seeds	FR 2018	3	4	4	<u>6</u>	3	5	5	2	4	5	3	3	2	5	6	0	6	6	4	8	7

1 = sehr früh/niedrig/gering; 9 = sehr spät/hoch/stark; kursiv = Vertriebsbeschreibung, unterstrichen = veränderte Beschreibung

Hy = Hybride, bg = begrannt

Winterweizen - Kornertrag der Sorten in länderübergreifenden Spätsaatversuchen
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten, inkl. Ergebnissen aus Niedersachsen

Anbaugesbiet	Nordwestdeutschland						
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026*	
Versuche	6	6	3	6	5		
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	101,3	93,2	77,7	99,0	83,7	93,8	n
Sorte (Qualität)							
SU Jonte (A)	96	99	102	<i>90</i>	<i>96</i>	95	21
LG Optimist (A)				<i>107</i>	105	106	8
Filius (A)					<i>107</i>	106	2
Intensity (bg) (A)					96	98	8
Chevignon [B]	101	99	96	103	101	98	27
Debian (B)		99	<i>120</i>	<i>111</i>	<i>107</i>	99	13
RGT Kreuzer (B)				99	<i>95</i>	96	7
Spectral (B)				99	93	98	13
KWS Keitum (C)	108	<i>103</i>	<i>109</i>	<i>108</i>	<i>103</i>	103	13
Winner (bg) [C]				<i>103</i>	<i>104</i>	102	5
Sommerweizen							
KWS Jordum (B)			101	100	106	100	15
Mohican (A)				<i>103</i>	<i>113</i>	107	5

bg = begrannt; *kursiv* = nicht in allen Versuchen geprüft

* Hohenheim-Gülzower Serienauswertung (n = Anzahl der Versuche)

Winterweizen - Kornertrag der Sorten in länderübergreifenden Stoppelweizenversuchen
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten, inkl. Ergebnissen aus Niedersachsen und Hessen

Anbauggebiet	Nordwestdeutschland						
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026*	
Versuche	7	7	5	5	4		
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	100,8	90,0	89,9	100,3	93,8	94,3	n
Sorte (Qualität)							
SU Jonte (A)	97	98	98	95	96	95	28
LG Optimist (A)				104	102	102	7
SU Tarroca [A]				97	99	94	9
Filius (A)					99	98	5
Chevignon [B]	100	101	99	105	99	99	29
Debian (B)		97	106	103	98	96	15
RGT Kreuzer (B)			101	105	99	102	9
Spectral (B)				101	102	102	10
LG Tomjol (B)					102	102	4
KWS Keitum (C)	111	103	106	105	107	104	27
Winner (bg) [C]			96	105	100	102	9
Anhang							
<i>Chevignon + Latitude XL</i>	104	108	94	105	102	101	13


bg = begrannt; *kursiv* = nicht in allen Versuchen geprüft

* Hohenheim-Gülsower Serienauswertung (n = Anzahl der Versuche)

Winterweizen - Winterhärte ausgewählter Sorten

Ergebnisse aus Feld- und Provokationsversuchen


Winterfestigkeit ausgewählter Winterweizensorten nach mehrjähriger Auswertung (2012-2026)



* = vorläufig (geringe Datenbasis)

Quelle: Christian Guddat (TLLLR), Volker Michel (LFA MV)


DON-Gehalte ausgewählter Winterweizensorten nach mehrjährige Auswertung (2020-2025)



Quelle: Nickl et al. (LfL Bayern)

Fallzahlsicherheit ausgewählter Winterweizensorten
nach mehrjähriger Auswertung (2014-2025)

Fallzahl (s) projiziert für ein mittleres Niveau aller Sorten bei 220 s



* = vorläufig (geringe Datenbasis)

Quelle: Volker Michel (LFA MV)