

Anbaupausen von Haupt- und Zwischenfrüchten

Fruchtart	Anbaupausen (Jahre)	Ursachen
Getreide u. a.		
Winterweizen	2	pilzl. Schaderreger, besonders Fußkrankheiten, Getreidezystenälchen
Wintergerste	2–3	pilzl. Schaderreger, besonders Fußkrankheiten, Getreidezystenälchen, Thyphula, Mehltau
Sommergerste	2	Getreidezystenälchen, Mehltau
Hafer	3–5	Getreidezystenälchen
Triticale, Dinkel	2–3	
Roggen	1–2	pilzl. Schaderreger, besonders Fußkrankheiten
Lein	6	Unverträglichkeit, Fusariosen
Gräserarten	–	weitgehend selbstverträglich
Hackfrüchte		
Mais	1–2	
Kartoffeln	3–4	Kartoffelzystenälchen
Zuckerrüben	4	pilzl. Schaderreger, Rübenzystenälchen
Raps, Rübsen, Futterrüben, Kohllarten	3–5	pilzl. Schaderreger, Rübenzystenälchen, Kohlhernie
Sonnenblume	6	pilzl. Schaderreger
Leguminosen u. a.		
Erbse	4–8	pilzl. Schaderreger, Unverträglichkeit, Fusariumwelke, Blattfleckenkrankheit
Rotklee, Inkarnatklee, Luzerne, Esparsette	4–7	Unverträglichkeit, Kleekebs, Fusariumwelke, Blattfleckenkrankheit
Ackerbohne, Lupine, Buschbohne, Peluschke, Wicke	3–5	Virosen, pilzl. u. tierische Schaderreger, Unverträglichkeit, Blattfleckenkrankheit, Fußkrankheiten, Stängelälchen, Lupinenwelke
Kleegras	3–4	Unverträglichkeit, Kleekebs, Kleeälchen, Kleewürger, Fusariumwelke u. a. pilzl. Erreger
Sojabohne	3–4	pilzl. Schaderreger
Linse	5	pilzl. Schaderreger
Weißklee, Gelbklee, Schwedenklee, Serradella	1–3	wie andere Kleearten, Weißklee weitestgehend selbstverträglich