

Ertragsleistungen der Sommerweizensorten - mehrjährig

(fallend sortiert nach Gesamtmittel des aktuellen Jahres)

Anbaugebiet	Lehmstandorte					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prüfjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Versuche	5	5	5	4	5	5
Ertrag dt/ha	69,1	77,2	87,8	81,0	78,3	72,5
drei- und mehrjährig geprüft						
Tybalt (A)	108	109	103	105	102	101
KWS Chamsin (A)	102	98	102	100	99	97
Sonett (E)	<u>91</u>	101	102	96	100	93
zweijährig geprüft						
Quintus (A)		<u>107</u>	<u>108</u>	<u>101</u>	106	104
Cornetto (A)		<u>107</u>	<u>104</u>	<u>106</u>	101	103
erstjährig geprüft						
Licamero (A)			<u>102</u>	<u>106</u>	<u>109</u>	103

xxx = Wertprüfungsergebnisse, geringe Standortzahl

Proteingehalte (relativ) der Sommerweizensorten - mehrjährig

(fallend sortiert nach Ergebnissen 2015, behandelte Variante)

	Mittel der Versuche									
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Protein in TM %	13,8	13,2	13,2	13,1	14,4	13,2	13,9	14,5	13,6	14,0
drei- und mehrjährig geprüft										
Sonett (E)	103	102	102	102	104					
KWS Chamsin (A)	103	102	102	103	106	100	96			
Tybalt (A)	100	99	98	99	96	97	97	96	102	99
zweijährig geprüft										
Quintus (A)	97	98								
Cornetto (A)	96	100								
erstjährig geprüft										
Licamero (A)	101									

Agronomische Eigenschaften der Sommerweizensorten

			agronomische Merkmale			Krankheitsanfälligkeit für ...							Qualitätsmerkmale				Ertragsbildung über...		
Sorten	Züchter/Vertrieb	Zu-lassungs-jahr	Reife	Pflan-zen-länge	Lager-neigung	Mehl-tau	Blatt-septoria	DTR	Gelb-rost	Braun-rost	Ähren-fusa-rium	Spel-zen-bräune	Fallzahl	Fallzahl-stabilität	Protein-gehalt	Sedi-Wert	Bestan-des-dichte	Korn-zahl je Ähre	TKM
Cornetto(A) , 1, Gr.	Secobra/BayWa	2013	6	4	4	2	5		5	4	4		8	6	6	7	3	7	8
KWS Chamsin(A) ,1	KWS Getreide	2008	5	3	2	5	6	6	6	6	5	5	7	5	8	9	3	6	7
Licamero (A) , 1	Secobra/BayWa	2014	5	4	5	3	4		4	7	3		5	5	7	9	5	6	7
Quintus(A) , 1, Gr.	Eckendorf/SU	2013	5	4	4	5	4		2	2	3		6	5	7	9	5	5	7
Sonett(E)	SW Seed/Syngenta	2010	5	5	4	2	5	6	2	4	6		7	5	9	9	6	6	4
Tybalt(A)	Eckendorf/ SU	2004	6	2	4	1	5	5	3	2	6		8	6	6	7	5	5	7
Erläuterungen:			= schlechter als der Durchschnitt					= besser als der Durchschnitt					1= Herbstsaat möglich Gr.= begrannt						

Sortenempfehlung Sommerweizen

	alle Standorte
mehrfährig geprüft	Tybalt (A)
zweijährig geprüft	Quintus (A) Cornetto (A)
neue Sorten (Testanbau)	Licamero (A)