

LSV frühe Speisesorten 2006

Mittel von drei Standorten

	Sorte	Einzelwerte der Standorte			Mittelwert von drei Standorten ¹⁾							
		Marktwareertrag < 35 mm rel.			Stärke %	Sortierung			Marktwareertrag > 35 mm			
		Buir	Waldniel	Sassen- berg		< 35 mm	35-60	> 60 mm	dt/ha 2006	rel. 2006	rel. 2005	rel. 2004
1	Cilena	73	73	63	12,7	9	76	15	304	73	77	85
2	Marabel	114	103	133	12,3	5	73	22	490	118	110	115
3	Princess	92	110	94	9,9	16	77	7	431	104	100	103
4	Belana	89	103	77	13,4	16	77	7	398	96	97	-
5	Vienna	112	120	133	11,1	7	81	12	518	125	116	-
6	Annabelle	90	83	87	12,0	8	73	19	371	89	92	89
7	Mirage	99	86	97	12,8	8	85	7	400	96	-	-
8	Madeleine ²⁾	131	121	-	12,4	3	57	40	609	-	-	-
9	Triumpf ³⁾	-	-	115	12,3	1	83	16	366	-	-	-
		100= 415 dt/ha	100= 556 dt/ha	100= 319 dt/ha	11,9	10	76	14	416	100	100= 560 dt/ha	100= 511 dt/ha

1) Mittelwert Marktwareertrag der Standorte ohne den Madelein- und Triumpfsertrag, daher liegt der relative Ertrag höher als der Mittelwert der drei Einzelstandorte

2) Mittelwerte der zwei rhein. Standorte

3) nur Standort Sassenberg

Sortenbeschreibung LSV frühe Speisesorten 2006

nach BSA Liste 2006; Holl. Liste 2003, angepaßt ¹⁾; Züchterangaben ²⁾; und eigene Beobachtungen ³⁾

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:				Neigung zu:					Keimfreudigkeit
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Schorf	Zwie-wuchs	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit	Übergrößen	Untergrößen	
1 Cilena	3	f	lang	gelb	6	4	3	5	4	4	4	4	4	3
2 Marabel	3	vf	oval	gelb	2	4	4	4	3	3	1	6	4	4
3 Princess ²⁾	3	f	oval	dunkelgelb	2	3	3	3	6 ³⁾	3	2	5	4	3
4 Belana	3	f	oval	gelb	1	4	3	4	3	3	3	4	5	3 ³⁾
5 Vienna	3	f	landoval	hellgelb	6	4	4	3	3	3	3	4	4	6
6 Annabelle ^{2;3)}	3/2	f	lang	dunkelgelb	4	6	3	3	4	3	3	5	6	4
7 Mirage	3	f	langoval	gelb	2	5	3	6	3	3	1	3	4	4
8 Madeleine 2)	3	vf	oval	gelb	-	4	3	3	-	-	-	-	-	3
9 Triumph	3	vf	langoval	gelb	1	5	4	4	5	3	3	5	3	4

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch

LSV mittelfrühe Speisesorten 2006

Mittel der rheinischen Standorte

	Sorte	<i>Einzelwerte der Standorte</i>		<i>Mittelwert von zwei Standorte</i>								
		Martwareertrag < 35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Martwareertrag > 35 mm			
		Buir	Waldniel		< 35 mm	35-50	50-60	> 60 mm	dt/ha 2006	rel. 2006	rel. 2005	rel. 2004
1	Edelstein	98	84	20,0	2	37	36	26	636	90	95	96
2	Andante	105	120	12,3	2	35	35	29	799	113	117	107
3	Gourmandine	91	87	12,2	2	32	40	27	628	89	97	78
4	Bernadette	91	89	12,3	2	22	32	45	635	90	97	94
5	Rafaela	100	108	9,9	2	27	39	32	739	105	-	-
6	Jelly	109	103	14,1	1	11	21	67	746	106	116	112
7	Laura	92	99	13,9	2	33	38	28	680	96	101	-
8	Lolita	99	102	13,8	3	39	32	26	710	100	-	-
9	Melody	115	109	12,9	2	16	25	56	790	112	108	-
		100= 627 dt/ha	100= 859 dt/ha	13,5	2	28	33	37	707	100	100= 779 dt/ha	100= 629 dt/ha

LSV mittelfrühe Speisesorten 2006

Standort Sassenberg

	Sorte	Rohertrag Sassen- berg	Mittelwert von der Standorte							
			Stärke %	Sortierung			Marktwareertrag > 35 mm			
				< 35 mm	35-60	> 60 mm	dt/ha 2006	rel. 2006	rel. 2005	rel. 2004
1	Jelly	569	13,2	4	71	26	547	122	104	119
2	Andante	542	11,9	2	87	11	533	119	104	102
3	Lolita	391	14,2	6	86	8	370	83	101	-
4	Rafaela	389	10,3	14	86	0	337	75	98	-
		100= 473	12,4	6	82	11	447		100= 564 dt/ha	100= 596 dt/ha

Sortenbeschreibung LSV frühe/ mittelfrühe Speisesorten 2006

nach BSA Liste 2006; holl. Liste 2003, angepaßt 1) ; Züchterangaben 2) und eigene Beobachtungen 3)

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:				Neigung zu:					Keimfreudigkeit
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Schorf	Zwiezwuchs	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit	Übergrößen	Untergrößen	
1 Edelstein	4	f	langoval	gelb	1	4	4	3	4	3	3	5	4	4
2 Andante	5	f	langoval	gelb	4	4	4	3	4	3	2	6	3	2
3 Gourmandine ²⁾	5	f	lang	gelb	-	4	4	4 ³⁾	3 ³⁾	3 ³⁾	3 ³⁾	4	4	2
4 Bernadette ²⁾³⁾	4	f	lgo / lg	gelb	1	3	-	3	4 ³⁾	3 ³⁾	-	5 ³⁾	4 ³⁾	3 ³⁾
5 Rafaela	4	f	oval	gelb	1	5	3	6	4	4	1	6	2	2
6 Jelly	6	vf	oval	gelb	2	5	3	3	3	3	2	8	3	3
7 Laura	5	vf	oval	tiefgelb	1	4	3	4	3	3	2	7	3	3
8 Lolita	4	vf	langoval	gelb	2	3	4	3	5	3	1	4	4	3
9 Melody ¹⁾	5	m	oval	gelb	3	5	3	3	-	-	3	6	3	-

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch