

Tabelle 1: Sortenbeschreibung frühe Speisesorten

Sortenbeschreibung LSV frühe Speisesorten 2009
nach BSA Liste 2009; Züchterangaben ¹⁾; und eigene Beobachtungen ²⁾

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:				Neigung zu:					Keimfreudigkeit
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Schorf	Zwie-wuchs	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit	Übergrößen	Untergrößen	
1 Annabelle ^{1;2)}	3/2	f	lang	dunkelgelb	4	6	3	3	4	3	3	5	6	6
2 Gala	3	vf	rundoval	gelb	1	5	3	4	3	3	1	4	6	4
3 Augusta ^{1;2)}	2	m	rundoval	gelb	-	6	3	3	3	4	1	5	4	4
4 Agila	3	f	langoval	hellgelb	2	5	4	4	5	3	1	7	2	4
5 Madeleine ^{1;2)}	3	vf	oval	gelb	-	4	3	3	-	-	-	5	5	3
6 Musica ^{1;2)}	3	f	langoval	gelb	-	5	3	3	-	-	3	6	4	4
7 Natascha	3	vf	oval	tiefgelb	3	4	3	5	3	3	2	4	5	6
8 Primadonna	3	vf	oval	gelb	3	6	3	3	3	4	3	5	4	4
9 Francisca	3	vf	oval	gelb	3	6	3	3	3	3	1	3	5	6
10 Sissi	3	f	langoval	tiefgelb	2	4	3	3	3	4	2	6	3	4

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig
3 = gering, niedrig
5 = mittel
7 = stark, hoch

Tabelle 2: Sortenbeschreibung mittelfrühe Speisesorten

Sortenbeschreibung LSV mittelfrühe Speisesorten 2009

nach BSA Liste 2008; holl. Liste 2007, angepaßt 1) ; Züchterangaben 2) und eigene Beobachtungen 3)

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleischarbe	Anfälligkeit für:				Neigung zu:					Keimfrei- digkeit
					Y-Virus	Kraut- fäule	Knollen- fäule	Schorf	Zwie- wuchs	Wachs- risse	Schwarz- fleckigkeit	Über- größen	Unter- größen	
1 Belana	3	f	oval	gelb	1	4	3	4	3	3	3	4	5	3 ³⁾
2 Allians ^{2;3)}	5	f	langoval	tiefgelb	-	4	4	5	3	3	3	6	4	2
3 Finessa	4	f	langoval	gelb	5 ³⁾	4	5	3	3	3	1	5	3	3
4 Toscana	4	vf	oval	gelb	4	5	3	3	3	3	2	5	3	4
5 Red Fantasy	5	vf	oval	tiefgelb	1	3	3	3	4	3	2	6	3	3
6 Vivi	4	vf	oval	gelb	-	5	3	3	4 ³⁾	4 ³⁾	-	5	3	3
7 Krone	4	vf	oval	gelb	2	5	4	3	4	3	1	5	4	3
8 Merida	3	vf	rundoval	gelb	1	6	3	4	3	4	2	5	4	4
9 Soraya	4	vf	oval	gelb	1	5	3	3	4	3	1	5	3	3

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch

Tabelle 3: Ergebnisse frühe Speisesorten

LSV frühe Speisesorten 2009

Mittel von zwei Standorten

	Sorte	Einzelwerte der Standorte		Mittelwert von zwei Standorten								
		MW.-ertrag < 35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktwareertrag > 35 mm			
		Buir	Waldniel		< 35 mm	35-50	50-60	> 60 mm	dt/ha 2009	rel. 2009	rel. 2008	rel. 2007
1	Annabelle	94	90	13,0	4	45	31	20	463	92	100	98
2	Gala	99	81	13,2	1	32	43	23	454	90	96	101
3	Augusta	84	91	14,9	2	37	37	25	443	88	86	89
4	Agila	108	107	13,1	1	26	41	33	545	108	106	-
5	Madeleine	103	112	12,5	1	21	38	40	545	108	107	98
6	Musica	103	117	14,3	2	36	36	26	557	110	125	-
7	Natascha	106	102	13,7	1	35	34	29	525	104	94	-
8	Primadonna	101	100	13,4	1	28	40	31	508	100	88	-
9	Francisca	107	110	12,2	1	37	36	26	549	109	-	-
10	Sissi	96	89	13,4	1	29	35	35	465	92	-	-
		100= 482 dt/ha	100= 530 dt/ha	13,4	2	33	37	29	505		100= 630 dt/ha	100= 604 dt/ha

Tabelle 4: Ergebnisse mittelfrühe Speisesorten

LSV mittelfrühe Speisesorten 2009

Mittel der rheinischen Standorte

	Sorte	<i>Einzelwerte der Standorte</i>		<i>Mittelwert von zwei Standorte</i>								
		Marktertrag < 35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktertrag > 35 mm			
		Buir	Waldniel		< 35 mm	35-50	50-60	> 60 mm	dt/ha 2009	rel. 2009	rel. 2008	rel. 2007
1	Belana	92	90	15,0	1	35	37	27	498	91	99	93
2	Allians	94	102	14,5	1	31	36	32	540	99	98	107
3	Finessa	100	101	14,7	1	23	43	33	552	101	92	-
4	Toscana	112	110	14,3	1	20	39	40	607	111	113	-
5	Red Fantasy	95	95	14,3	1	15	30	54	521	95	92	-
6	Vivi	107	120	12,8	1	17	34	48	628	115	108	-
7	Krone	110	99	13,7	1	19	35	45	569	104	80	-
8	Merida	96	97	12,5	1	20	34	45	529	97	-	-
9	Soraya	106	98	12,9	1	19	38	42	557	102	-	-
		100= 481 dt/ha	100= 615 dt/ha	13,9	1	22	36	41	556		100= 637 dt/ha	100= 680 dt/ha