

Grundstoff Fructose

Tabelle: Grundstoff Fructose (Fructose, β -D-Fructofuranose) - genehmigte Anwendungen

Kultur	Wirkung	Schaderreger	Anwendungsbereich	Art der Anwendung	Zeitpunkt	Zucker Aufwandmenge in Wasser	Mischung Aufwandmenge auf 10 m ²	Anzahl Anwendungen	Spritzabstand in Tagen	Wartezeit in Tagen
Freiland (zulässig für den Ökoanbau)										
Apfel	Elicitor (insektizide Wirkung)	Fruchtbohrer, u.a. Apfelwickler (<i>Cydia pomonella</i>)	Freiland	Blattspritzung, frühmorgens bis 9:00 Uhr	BBCH 6 (Unmittelbar vor Beginn des Blattknospenaufbruches: erstes Blattgrün gerade sichtbar) bis BBCH 65 (Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet, erste Blütenblätter fallen ab)	60-100 mg in 0,6-1,0 l Wasser	0,6-1,0 l	5-7	21	-
Mais (Körner- und Zuckermais)	Elicitor (insektizide Wirkung)	Gewächshaus-Zwergfüßer (<i>Scutigerella immaculata</i>)	Freiland	Behandlung in Saatreihe, frühmorgens bis 9:00 Uhr	beim Säen	4 mg in 40 ml Wasser	40 ml	1	-	-
Mais (Körner- und Zuckermais)	Elicitor (insektizide Wirkung)	Gewächshaus-Zwergfüßer (<i>Scutigerella immaculata</i>)	Freiland	Blattspritzung, frühmorgens bis 9:00 Uhr	1. Anwendung: BBCH 12/13 (2.-3. Laubblatt entfaltet), 2. Anwendung: BBCH 14 (4. Laubblatt entfaltet)	8,2 mg in 82 ml Wasser	82 ml	2	-	-
Weinrebe	Elicitor (insektizide Wirkung)	Amerikanische Rebzikade (<i>Scaphoideus titanus</i>)	Freiland	Blattspritzung, frühmorgens bis 9:00 Uhr	BBCH 17 (7 Laubblätter entfaltet) bis BBCH 57 (Gescheine [Blütenstände] sind voll entwickelt und die Einzelblüten spreizen sich)	15 mg in 150 ml Wasser	150 ml	3	7	-
Weinrebe	Elicitor (fungizide Wirkung)	Falscher Mehltau (<i>Plasmopara viticola</i>)	Freiland	Blattspritzung, frühmorgens bis 9:00 Uhr	BBCH 10 (Beginn der Blattentwicklung) bis BBCH 57 (Gescheine [Blütenstände] sind voll entwickelt und die Einzelblüten spreizen sich)	10-20 mg in 100-200 ml Wasser	100-200 ml	bis zu 12	15	-