

Tabelle 1: Futtermischungen im 1. und 2. Mastdurchgang (lt. Herstellerangabe)

Gewichtsabschnitt		30 – 60 kg		60 – 120 kg	
Gruppen		Kontrolle	Versuch	Kontrolle	Versuch
VevoVitall®,	%	-	0,5	-	0,5
Energie,	MJ ME/kg		13,4		13,0
Rohprotein,	%		17,5		17,0
Lysin,	%		1,10		0,95
Calcium,	%		0,80		0,75
Phosphor,	%		0,50		0,45

Tabelle 2: Ergebnisse des 1. Mastdurchganges

		Kontrollgruppe	Versuchsgruppe (0,5 % Benzoesäure)
Anzahl Tiere		188	215
Gewicht bei			
- Mastbeginn,	kg	28,7	27,1
- Mastende,	kg	121,3	120,0
tägl. Zunahme,	g	798	773
Futterverwertung,	kg/kg	2,69	2,71
Verluste,	%	2,7	6,0
Schlachtgewicht,	kg	96,4	95,4
MFA (FOM),	%	56,5	56,1

Tabelle 3: Ergebnisse des 2. Mastdurchganges

		Kontrollgruppe	Versuchsgruppe (0,5 % Benzoesäure)
Anzahl Tiere		216	188
Gewicht bei			
- Mastbeginn,	kg	26,1	27,1
- Mastende,	kg	117,1	119,7
tägl. Zunahme,	g	742	791
Futterverwertung,	kg/kg	2,84	2,79
Verluste,	%	4,2	2,1
Schlachtgewicht,	kg	93,1	95,2
MFA (FOM),	%	57,3	56,6