Gärqualität von Grünfuttersilagen (nach DLG-Beurteilungsschlüssel 2006)							
Kenngößen:		Orientierungswert*)					
pH-Wert bei Silagen	mit 20 - 30 % TM-Gehalt	kleiner 4,0					
	mit 30 - 45 % TM-Gehalt	kleiner 4,5					
	über 45 % TM-Gehalt	kleiner 5,0					
Essigsäure	% in TM	2,0 - 3,0					
Buttersäure	% in TM	kleiner 0,3					
Ammoniak-N-Anteil (NH₃-N) des Gesamt-N	%	kleiner 8					
*) Bei Ballensilagen für Pferde sind Abweichungen möglich. Das Beurteilungsschema (DLG) für Silagen eignet sich nur begrenzt.							
Sinnenprüfung des Erntegutes							
Silage							
Geruch:	frei von Buttersäuregeruch, aromatisch bis brotartig, angenehm säuerlich						
Griff:	Blätter und Stängel sollen erhalten und nicht angegriffen, verschimmelt, verschmutzt oder gar schmierig sein						
Farbe:	dem Ausgangsmaterial entsprechend bis insgesamt leichte Bräunung						
Heu							
Geruch:	frisch, angenehm - aromatisch						
Griff:	rau, trocken						
Farbe:	frisch grün						
Mikrobiologisch-hygienische Beschaffenheit (Orientierungswerte in KBE ^{1)/g) nach VDLUFA 2011}							
Futter	Bakterien (aerob mesophil)			Schimmel- und Schwärzepilze			Hefen
	(in Mio. KBE/g)			(in Tsd. KBE/g)			(in Tsd. KBE/g)
	produkt typisch	verderb- anzeigend	produkt typisch	verderb- anzeigend	verderb- anzeigend		
	KG ² 1	KG 2	KG 3	KG 4	KG 5	KG 6	KG 7
Getreide:							
• Hafer	50 *	1	0,05	200 *	50	2	200 *
• Gerste	20 *	1	0,05	40 *	30	2	100*
• Mais	2 *	0,5	0,05	20 *	30	5	60 *
• Weizen	5 *	0,5	0,05	30 *	20	2	30 *
Pellets für Pferde	0,5	0,5	0,01	2	6	1	5
Heu	30 *	2	0,15	200 *	100	5	150 *
Stroh	100 *	2	0,15	200 *	100	5	400 *
1) KBE = koloniebildende Einheiten 2) KG = Keimgruppe * Erntefrische Produkte können wesentlich höhere Keimgehalte aufweisen.							

Allgemeine Hinweise zur Rationsgestaltung		
<ul style="list-style-type: none"> Um Pferde ausreichend kauend zu beschäftigen, täglich mindestens 0,6 bis 0,8 kg Raufutter (Heu/Stroh/Anwelsilage) pro 100 kg Lebendmasse verfüttern; max. 0,8 kg Stroh / 100 kg Lebendmasse. Gute Anwelsilage oder Heulage kann in der Strukturwirkung gut Heu/Stroh ersetzen. Zur Vermeidung von Verstopfungen kein zu kurz gehäckselttes Gras oder Raufutter verabreichen (> 5 cm) Möglichst lange Kauzeiten begünstigen die Speichelproduktion und einen ungestörten Ablauf der Verdauung im Magen. Pferde im Erhaltungsstoffwechsel und bei Arbeit benötigen in der Ration etwa 5 g verdauliches Rohprotein (v. Rp.) pro MJ verdauliche Energie (DE). Hochtragende Stuten benötigen rund 6 bis 7 g v. Rp, laktierende Stuten 9 g v. Rp pro MJ DE. Das Ca:P- Verhältnis sollte in Futtrationen nicht unter 1 : 1 und nicht über 2,5 : 1 liegen. Die Natrium- und Chlorversorgung stets durch Lecksteine oder Leckmassen absichern. Übermäßige Vitamin D-Gaben unbedingt vermeiden. Der Anteil „unzerkleinerter“ Rohfaser sollte in der Trockenmasse der Gesamtration 16 bis 18 %, bei Pferden mit geringer Futteraufnahme 20 bis 22 % betragen. Grobfutter (Raufutter) sollte grundsätzlich vor dem Weideaustrieb, Krippenfutter (Krafffutter) dagegen nach dem Eintrieb verfüttert werden. Grobfutter immer vor dem Krafffutter verabreichen. Kraft- und Grobfutterverteilung bei 3 Mahlzeiten/Tag: 		
	Krafffutter	Grobfutter
morgens	1/4	1/4 oder 1/3
mittags	1/4	1/4 oder 1/3
abends	1/2	1/2 oder 1/3
<ul style="list-style-type: none"> Stärkereiche Komponenten (Mais, Gerste) möglichst nur hydrothermisch (mit Dampf/Hitze) behandelt einsetzen. 		
Pferde-Spezialberatung der LWK NRW		
Fütterung:		
Dr. Gerhard Stalljohann	MS	0251 / 2376-860
Heinrich Bußmann	MS	0251 / 2376-858
Tiergesundheitsdienst:		
Zentrale	MS	0251 / 2376-861
Stand: Mai 2012

Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen

Ihr Partner für Untersuchung und Beratung

Kenndaten

zur

Qualität von Futtermitteln

für

Pferde

in Zusammenarbeit mit dem Referat

Tierproduktion

Tel. 02 51 / 23 76 - 8 57

Fax. 02 51 / 23 76 - 8 69

Nevinghoff 40
48147 Münster

Tel. +49 (0) 251 2376-595
Fax +49 (0) 251 2376-702

lufa@lwk.nrw.de
www.lufa-nrw.de

Merkmale der Futterqualität

MJ DE = Megajoule verdauliche Energie
 NH₃-N = Ammoniak-Stickstoff

Kenndaten der Futterqualität

Ballensilage (Anwelk-Grassilage)

I. Inhaltsstoffe/Futterwert	Kenndaten
Trockenmassegehalt (TM) %	40 - 50
Rohasche % in TM	unter 10
Sand % in TM	unter 3
Rohfaser % in TM	27 - 30
Zucker % in TM	unter 8
Energie (Pferd) MJ DE/kg TM	9,5 - 11
Verdichtung kg T/m ³	über 220

Schnitzeitpunkt: **Grünland:** Mitte bis Ende der Blüte bei den Hauptbestandsbildnern
Ackergras: Beginn bis Ende der Blüte

II. Mineralstoffe	Kenndaten
Calcium (Ca) % in TM	0,35 - 0,55
Phosphor (P) % in TM	0,25 - 0,35
Natrium (Na) % in TM	über 0,10
Kalium (K) % in TM	unter 3,00
Magnesium (Mg) % in TM	über 0,10

III. Spurenelemente	Kenndaten
Kupfer (Cu) mg/kg TM	7 - 12
Zink (Zn) mg/kg TM	über 50
Mangan (Mn) mg/kg TM	über 40
Eisen (Fe) mg/kg TM	60 - 80 *)
Selen (Se) mg/kg TM	0,15 - 0,25

*) bis 100 für Fohlen

Heu

I. Inhaltsstoffe/Futterwert	Kenndaten
Trockenmassegehalt (TM) %	über 84
Rohasche % in TM	unter 10
Rohfaser % in TM	30 - 33
Energie (Pferd) MJ DE/kg TM	8,5 - 10

Heulage

I. Inhaltsstoffe/Futterwert	Kenndaten
Trockenmassegehalt (TM) %	50 - 70
Rohasche % in TM	unter 10
Rohfaser % in TM	27 - 32
Energie (Pferd) MJ DE/kg TM	9 - 10,5
Verdichtung kg T/m ³	über 210

Orientierungswerte für die Trinkwasserbeurteilung (BMELV, 2007)

Parameter	Einheit	Ziel	Bemerkungen
pH-Wert ¹⁾		> 5, < 9	Korrosion im Leitungssystem
Elektr. Leitfähigkeit	(µS/cm)	< 3000	Schmackhaftigkeit, Durchfall
Lösl. Salze, gesamt	(g/l)	< 2,5	
Oxidierbarkeit ²⁾	(mg/l)	< 15	
Ammonium (NH ₄ ⁺)	(mg/l)	< 3	Hinweis auf Verunreinigung
Arsen (As)	(mg/l)	< 0,05	Gesundheitsstörungen, Minderleistungen
Blei (Pb)	(mg/l)	< 0,1	
Cadmium (Cd)	(mg/l)	< 0,02	
Calcium (Ca)	(mg/l)	500	Funktionsstörungen, Kalkablagerungen in Rohren/Ventilen
Chlorid (Cl ⁻)	(mg/l)	< 500	
Eisen (Fe ²⁺)	(mg/l)	< 3	Antagonist zu anderen Spurenelementen, Eisenablagerungen in Rohren/Tränknippeln, Biofilmbildung, Schmuckhaftigkeit
Fluorid (F ⁻)	(mg/l)	< 1,5	Störung an Zähnen und Knochen
Kalium (K)	(mg/l)	< 500	
Kupfer (Cu)	(mg/l)	< 2	
Mangan (Mn)	(mg/l)	< 4	Ausfällungen im Verteilersystem, Biofilme möglich
Natrium (Na)	(mg/l)	< 500	
Nitrat (NO ₃ ⁻)	(mg/l)	< 200	Risiko für Methämoglobinbildung, Gesamtaufnahme berücksichtigen
Nitrit (NO ₂ ⁻)	(mg/l)	< 30	
Quecksilber (Hg)	(mg/l)	< 0,003	Allgemeine Störungen
Sulfat (SO ₄ ⁻)	(mg/l)	< 500	Laxierender Effekt

¹⁾ pH < 5 sauer und möglicherweise korrosiv wirkend, Zusatz organischer Säuren kann pH-Wert senken

²⁾ Maß für organische Substanzen im Wasser (< 5 mg/l für eingespeistes Wasser)

Mikrobiologische Parameter

Parameter	Einheit	erhöht	bedenklich	unbrauchbar
Koloniezahl bei 20°C	in 1 ml	> 100	> 1.000	> 10.000
Koloniezahl bei 36°C	in 1 ml	> 100	> 1.000	> 10.000
Coliforme Keime	in 100 ml	> 10	> 100	> 1.000
Escherichia coli	in 100 ml	> 1	> 10	> 100